

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

## Bergamota 187 AD

**Tamaño:** Pequeño o muy pequeño.

**Forma:** Esférica o maliforme. Muy ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

**Cavidad del pedúnculo:** Nula. **Pedúnculo:** Largo. Fino, bastante engrosado en su extremo y a veces también en la base, en este caso carnosa. Recto o ligeramente curvo, generalmente con dos o mas iniciaciones de yemas. Color amarillento parcialmente ruginoso. Implantado derecho.

**Cavidad del ojo:** Anchura media, casi superficial, borde muy regular y liso. **Ojo:** Mediano. Abierto. Sépalos erectos, cóncavos generalmente sin punta.

**Piel:** Lisa, fina, brillante, ligeramente untuosa. **Color:** Verde amarillento o alimonado, sin chapa o a lo sumo pequeña zona dorado sonrosada. Punteado muy abundante, menudo, aureolado de verde, la aureola va desapareciendo a medida que los frutos maduran. Zona ruginosa compacta alrededor del ojo, con frecuencia sobrepasando el borde de la cavidad.

**Tubo del cáliz:** En forma de embudo cónico, con conducto corto y estrecho.

**Corazón:** Pequeño. Redondeado, muy pedregoso, situado casi en el centro del fruto. Eje abierto, corto, bastante ancho en la parte mas alejada del ojo y estrechándose bruscamente hacia éste. Interior del eje lanoso. Celdillas pequeñas, situadas muy altas.

**Semillas:** Pequeñas, elípticas, puntiagudas, espolonadas. Color castaño casi negro

**Carne:** Color crema. Granulosa, seca. **Sabor:** Amoscatelado, poco dulce. Mediano.

**Maduración:** Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

